

Napkin dermatitis

التهابات الحفاضات في الأطفال

Diagnosis

التهاب و احمرار شائع جداً مكان الحفاضة (البامبرز) في الأطفال غالباً بسبب contact dermatitis (d.t. irritation from urine) + fungal infection في أغلب الأحيان بتبقى التهابات فقط من البول و أحياناً بتبقى فطريات

أفرق بينهم ازاي ؟

- لو في Dermatitis فقط : Normal inguinal folds
- لو في Fungal infection : Affected inguinal folds + satellite lesions

الوقاية Prevention

١. تنظيف الطفل باستمرار و تنشيفه جيداً
 ٢. تعريض الطفل للهواء ١٠ دقائق قبل وضع الحفاضة الجديدة
 ٣. وضع كريم مرطب قبل وضع الحفاضة الجديدة
- Zinc Olive cream 8.75 LE

Treatment

١. تغيير نوع الحفاضة لو المشكلة متكررة (ممكن حساسية لنوع الحفاضة نفسه)
 ٢. مضاد فطريات + كورتيزون ضعيف (عشان تبقى غطيت السببين)
- Dermatin-cort cream 3.5 LE
 - Miconaz-H cream 5.5 LE
 - Dahtacort cream حلو جداً 8 LE
 - Momenta cream أفضلهم 21 LE

نفس العلاج ممكن يستخدم في تسلخات الكبار

يفضل عدم استخدام كريم **Kenacomb** في الحالات دي لأنه يحتوي على نوع كورتيزون لا يصلح لاستخدامه في الأطفال و Inguinal fold